

ADDENDA

(Plantes omises, ou reçues au cours de l'impression.)

PARTIE I

Pages

ajoutez : **CLEMATIS**

1 — — **Buchaniana** DC. — Himalaya.

CALYCANTHUS

2 — — **occidentalis** Hook. et Arnott. — Californie.

SCHIZANDRA (après *Liriodendron*.)

4 — — **chinensis** Baillon. — Chine et Japon.

BERBERIDOPSIS

4 — — ***corallina** Hook. f. — Chili.

MENISPERMUM

4 — — **dahuricum** DC. — Sibérie, Chine et Japon.

HELIANTHEMUM

6 — — **ledifolium** Mill. — Europe méridionale.

ACTINIDIA

8 — — **Kolomicta** Rupr. — Chine et Japon.

8 — — **polygama** Sieb. et Zucc. — Japon.

FREMONTIA (STERCULIACÉES) (après *Malvacées*).

8 — — ***californica** Torr. — Californie.

TILIA

8 — — **americana** Loud. — Amérique septentrionale.

8 — — **cordata** Mill., var. **JAPONICA** Miq. — Japon.

8 — — **dasystyla** Stev. — Caucase.

8 — — **heterophylla** Vent. — Amérique septentrion.

9 — — **mandschurica** Rupr. — Mandchourie.

9 — — **Maximowicziana** Shirasawa. — Japon.

Pages

- ajoutez : **BERCHEMIA** (avant *Rhamnus*).
- 11 — — **racemosa** Sieb. et Zucc. — Japon.
- CEANOTHUS**
- 11 — — **americanus** L. — États-Unis.
- VITIS**
- 11 — — **Brandtii** Hort. — Patrie inconnue.
- KÆLREUTERIA**
- 12 — — **paniculata** Laxm., var. **K. JAPONICA** Hassk.
- DODONÆA** (après *Kæltreuteria*).
- 12 — — ***viscosa** Jacq. — Régions trop. et subtropicales.
- ÆSCULUS**
- 12 — — **californica** Nutt. (*Pavia californica* Hartw.).
Amérique septentrionale.
- 12 — — **chinensis** Bunge. — Chine.
- 12 — — **glabra** Willd. (*Pavia pallida* Spach). — Amé-
rique septentrionale.
- 12 — — **Hippocastanum**, var. **VARIEGATUM** Hort.
- 12 — — **neglecta** Lindl. — Origine horticole
- ACER**
- 14 — — **tataricum** L. — Europe orientale.
- SCHINUS** (avant *Rhus*).
- 14 — — ***aroeira** Vell. — Brésil.
- GENISTA**
- 15 — — **monosperma** Lamk. — Région méditer.
- ULEX**
- 15 — — **europæus** L. Europe, var. **FLORE PLENO** Hort.
- CYTISUS**
- 16 — — **Alschingeri** Vis. — Dalmatie.
- 16 — — **biflorus** L'Hérit. — Europe orientale.
- COLUTEA**
- 18 — — **longialata** Kœhne. — Asie Mineure.
- ERYTHRINA** (après *Lespedeza*).
- 18 — — ***corallodendron** L. — Amérique septentr.

Pages

ajoutez : **PRUNUS**

- 20 — — **divaricata** Ledeb. — Caucase. (Sect. IV).
 20 — — **Puddum** Roxb. — Himalaya. (Sect. IV).
 20* — — **pensylvanica** L. f. — Amér. sept. (Sect. V).
 21 — — **Ssiori** Fr. Schm. — Ile Sachalin. (Sect. VI).

SPIRÆA

- 21 — — **bullata** Maxim. (*S. crispifolia* Hort.). Japon.
 21 — — **croatica**, Auct.? (*Sibiræa croatica* A. de Degen). — Croatie.
 21 — — **Fontanesii** Billiard (*S. Fontenaysii* Hort.; *S. canescens* × *salicifolia*).

NEILLIA (après *Holodiscus*.)

- 22 — — **opulifolia** Benth. et Hook. f. (*Spiræa opulifolia* Hort.). — Amérique septentrionale, var. **AUREA** Hort.
 22 — — **amurensis** (*Physocarpa amurensis* Maxim.; *Spiræa amurensis* Hort.). — Mandchourie.

PIRUS

- 28 — — **rotundifolia** Bechst. (*Aria latifolia* Lamk; *Sorbus latifolia* Pers.). — Europe. (Sect. III).
 28 — — **Torminalis** DC. (*Sorbus Torminalis* Crantz). — Europe. (Sect. III).

CRATÆGO-MESPILUS (avant *Cratægus*.)

- 29 — — **Asnieresii** Simon-Louis (*Cratægus oxyacantha* × *Mespilus germanica*, var. *Asnieresii* Kœhne).
 29 — — **Dardari** Simon-Louis (*Cratægus oxyacantha* × *Mespilus germanica*, var. *Dardari* Kœhne).

(Voir *Le Jardin*, 1899, p. 22; *Revue Horticole*, 1899, pp. 403, 483, 530.)**CRATÆGUS**

- 29 — — **Azarolus** L. — Orient.

COTONEASTER

- 30 — — **baccillaris** Wall. — Himalaya.

HYDRANGEA

- 30 — — **quercifolia** Bartram. — Amérique septentr.

PHILADELPHUS

- 32 — — **sericanthus** Kœhne (*spec. nov.*). — Chine.

- Pages
ajoutez : **RIBES**
- 32 — — **floridum** L'Hérit. — Floride.
- ACANTHOPANAX** (après *Aralia*).
- 35 — — ***ricinifolium** Seem. — Chine et Japon.
- CORNUS**
- 35 — — ***capitata** Wall. (*Benthamia fragifera* Lindl.)
— Chine.
- LONICERA** (Sect. I).
- 36 — — **Giraldii** Rehder (*spec. nov.*). — Se-tchuen.
Cette espèce, introduite par les soins de M. M. de Vilmorin, est très distincte de ses congénères horticoles par ses feuilles longues, étroites et très velues. Ses fleurs sont petites, pourpre rougeâtre, bilabiées, à étamines longuement saillantes et disposées en bouquets axillaires très compacts. Elle a fleuri pour la première fois à Verrières en 1903.
- 37 — — **Sullivanti** A. Gray. — Amérique septentr.
- LEUCOTHOE**
- 39 — — **axillaris** D. Don (*Andromeda axillaris* Lamk).
— Sud des États-Unis.
- LYONIA** (après *Leucothoe*).
- 39 — — **ligustrina** DC. (*Andromeda ligustrina*,
Muhl.). — Amérique septentrionale.
- GAULTHERIA**
- 39 — — **Shallon** Pursh. — Amérique septentrionale.
- RHODODENDRON**
- 42 — — ***arboreum** Smith. — Himalaya.
- 42 — — **brachycarpum** G. Don. — Japon.
- 42 — — **caucasicum** Pall. — Caucase.
- 42 — — **chrysanthum** Pall. — Dahourie.
- 42 — — **intermedium** Tauch. — Tyrol.
- 42 — — **parvifolium** Adams. — Sibérie, Chine.
- 42 — — **Falconeri** Hook. f. — Himalaya.
- 42 — — **myrtifolium** Lodd. (*R. hirsutum* × *punctatum*).
- DIOSPYROS**
- 42 — — ***lucida** Wall. — Indes orientales.
- 42 — — **Lotus** L. — Asie tempérée.
- HALESIA**
- 42 — — **diptera** L. — États-Unis.

Pages

ajoutez : **FRAXINUS**44 — — **mandschurica** Rupr. — Mandchourie.**CATALPA**48 — — **Kæmpferi** Sieb. et Zucc. — Japon.48 — — **Bungei** C. A. Mey. — Chine.**RHAPHITHAMNUS** (avant *Callicarpa*).— ***cyanocarpus** Miers. — Chili.**CLERODENDRON**48 — — **foetidum** Bunge. — Chine.**ATRAPHAXIS** (avant *Polygonum*).49 — — **lanceolata** Bunge. — Asie tempérée.**EMBOTHRIMUM** (PROTÉACÉES) (après *Lindera*.)50 — — ***coccineum** Forst. — Magellan.**DAPHNE**50 — — **oleoides** Schreb. (*D. collina* Urv.). — Europe,
Asie Mineure.50 — — **sericea** Vahl (*D. neapolitana* Lodd.). —
Europe méridionale.**EDGEWORTHIA**50 — — **Gardneri** Meissn. (*E. papyrifera* Sieb. et
Zucc.). — Chine et Japon.**ZELKOVA**52 — — **Verschaffelti** Dippel. — Asie orientale.**BROUSSONETIA**52 — — **Kæmpferi** Sieb. — Japon.**CARYA**53 — — **alba** Nutt. — Amérique septentrionale.53 — — **amara** Nutt. — Amérique septentrionale.53 — — **aquatica** Nutt. — Amérique septentrionale.53 — — **sulcata** Nutt. — États-Unis.53 — — **tomentosa** Nutt. — Amérique septentrionale.**JUGLANS**53 — — **cordiformis** Maxim. — Japon.53 — — **rupestris** Engelm. — Amérique septentr.

Pages

ajoutez : **PLATYCARYA** (après *Pterocarya*).53 — — **strobilacea** Sieb. et Zucc. — Japon.**BETULA**54 — — **globispica** Shirai. — Japon.54 — — **humilis** Schrank. — Hémisphère septentr.54 — — **lenta** L. — Amérique septentrionale.54 — — **papyrifera** Marsh. — Amérique septentr.54 — — **populifolia** Marsh. — Amérique septentr.54 — — **utilis** D. Don. — Himalaya.**CORYLUS**54 — — **americana** Walt. — Amérique septentr.**QUERCUS**54 — — **ambigua** Kit. — Europe.55 — — **prinoides** Willd. (*Q. Chinquapin* Pursh.; *Q. Prinus*, var. *Chincapin* Michx). Amér. sept.55 — — **Toza** Bosc. — Europe méridionale.**CASTANOPSIS** (après *Quercus*).55 — — * **chrysophylla** A. DC. — Californie et Orégon.**CASTANEA**55 — — **dentata** (*C. americana* Rafin.; *C. vesca*, var. *americana*, Michx.). — Amérique septentr.**SALIX**56 — — **myrsinites** L., var. **JACQUINIANA** Anders. — Alpes d'Autriche.56 — — **petiolaris** Smith (*S. sericea* Marsh.). — Amérique septentrionale.57 — **POPULUS**— **laurifolia** Ledeb. (*P. balsamifera*, var. *laurifolia* Wesm.; *P. salicifolia* Hort.). — Altaï et Sibérie.**YUCCA**57 — — **filamentosa**, var. **FLACCIDA** Baker.**PINUS**62 — — * **Ayacahuite** Ehrenb. — Mexique et Guatémala.

Pages

ajoutez : **LARIX**66 — — **kurilensis** Mayr. — Japon?**ABIES**68 — — **balsamea**, var. **HUDSONICA** Sargent.69 — — **Mariesii** Masters. — Japon.69 — — **sibirica** Ledeb. — Sibérie.

PARTIE II**RANUNCULUS**76 — — **parnassifolius** L. — Ț. Europe.76 — — **serbicus** Vis. — Ț. Serbie.**AQUILEGIA**79 — — **olympica**, var. **WITMANNIANA** Stev.**CAULOPHYLLUM**82 — — **thalictroides** Michx. — Ț. Amérique sept.**EPIMEDIUM**83 — — **pinnatum** Fisch. — Ț. Perse.**PAPAVER**85 — — **oreophyllum** Rupr. — Ț. Caucase.**MECONOPSIS**86 — — **integrifolia** Franch. — Ț. Yunnan.86 — — **racemosa** Maxim. — Ț. Chine.86 — — **Wallichii** Hook. — Ț. Himalaya.**DICENTRA**90 — — **canadensis** Walp. — Ț. Amérique sept.**CORYDALIS**90 — — **rosea** Zey. — Ț. Afrique australe.

Pages

ajoutez : **DRABA**

- 93 — — **Aizoon** Wahlenb. (*D. Haynaldi* Stur). — Ț. Europe.
 93 — — **pyrenaica** L. (*Petrocallis pyrenaica* R. Br.). — Ț. Pyrénées.

VIOLA

- 97 — — **arborescens** L. — Ț. Région méditer.
 97 — — **Jooi Janka**. — Ț. Transylvanie.

DIANTHUS

- 99 — — **alpinus** L., var. **ALBUS** Hort.

SILENE

- 102 — — **Asterias** Gris. Ț. Banat, v. **GRANDIFLORA** Hort.

ARENARIA

- 105 — — **cephalotes** Bieb. — Ț. Caucase.
 105 — — **longifolia** Bieb. — Ț. Russie.

PELARGONIUM

- 111 — — ***grandiflorum** Willd. — Ț. Cap. — Hybrides et variétés horticoles.
 111 — — ***graveolens** L'Hér. (*Géranium rosat*). Ț. Cap.
 111 — — ***odoratissimum** Ait. — Ț. Cap.
 111 — — ***peltatum** Ait. — Ț. Cap. — Variétés hortie.
 111 — — ***zonale** × **inquinans** Hort. Ț. Variétés hort.

ERODIUM

- 111 — — **chamædryoides** L'Hér. (*E. Reichardi* DC.). — Ț. Corse, Iles Baléares.

LUPINUS

- 113 — — **albus** L. — ①. Europe australe.

GEUM

- 123 — — **bulgaricum** Pançic. — Ț. Bulgarie.
 123 — — **montanum** × **coccineum** Rib. Ț. Bulgarie.

SAXIFRAGA

- 131 — — **Hostii** Tausch, var. **RHÆTICA** Kerner. — Ț. Europe méridionale. (Sect. X).
 131 — — **Infundibulum** Lange. — Ț. Patrie inconnue. (Sect. X).

Pages

ajoutez : **SAXIFRAGA**

- 131 — — **reniforme** Hort. — Ț. Patrie inconnue.
(Sect. X).
- 131 — — **cuneifolia**, var. **SUBINTEGRA** Hort. (*S. capillilepis* Rchb.). (Sect. X).
- 132 — — **balkana** Hort. Ț. Patrie inconnue. (Sect. XI).
- 132 — — **Forsteri** Stein. — Ț. Tyrol. (Sect. XI).
- 133 — — **Elisabethæ** Hort. — Ț. Patrie inconnue.
(Sect. XII).
- 134 — — **punctata** L. (*S. arguta* D. Don). — Ț.
Sibérie. (Sect. XII).

SEDUM

- 139 — — **spectabile** Bor. — Ț. Japon. — Var. **ATROPURPUREA** Hort.

SICYOS (après *Cyclanthera*).

- 150 — — **angulata** L. — Ț. Amérique septentrionale.

CHRYSOPSIS (après *Grindelia*).

- 160 — — **villosa** DC. (*C. foliosa* Nutt.). — Ț. Amérique septentrionale.

CELMISIA (après *Felicia*).

- 167 — — ***Munroi** Hook. f. — Ț. Nouvelle-Zélande.

ERIGERON

- 168 — — ***quercifolius** Lamk. (*Vittadinia triloba* Hort., non DC.). — Ț. Amérique septentrionale.

ACHILLEA

- 173 — — **Ageratum** L. — Ț. Europe.
- 174 — — **lingulata** Waldst. et Kit. — Ț. Europe orient.,
var. **BUGLOSSIS** Hort.

CAMPANULA

- 191 — — **canescens** Wall. Afganistan. — Ț. Variété.
- 193 — — **michauxioides** Boiss. — ②. Asie Mineure.

STATICE

- 197 — — **lavandulæfolia** Hort. Ț. Patrie inconnue.

BORRAGO

- 212 — — **laxiflora** Willd. — Ț. Corse.

Pages

ajoutez : **CALYSTEGIA**214 — — **dahurica** Choisy. — Ț. Sibérie.**DICHONDRA** (avant *Nolana*).215 — — ***repens** Forst. — Ț. Régions subtropicales.**VERONICA**234 — — ***Hulkeana** F. Muell. — Ț. Nouvelle-Zélande.**GLADIOLUS**272 — — ***cruentus** T. Moore. — Ț. Afrique australe.**TULIPA**308 — — **Tubergeniana** J. Hoog (*spec. nov.*). — Ț.
Bokhara.

N. B. — L'hybride *Nicotiana glauca* × *Tabacum*, cité p. 221, vient d'être nommé, par M. J. Poisson, **N. vedrariensis**.
